

پایه ششمی:

۱- گزینه ۳ پاسخ است.

$$\left. \begin{array}{l} a = 34q + r \\ r = 7q \end{array} \right\} \Rightarrow a = 34q + 7q = 41q \quad (q \in \mathbb{Z})$$

$$0 \leq r < 34 \Rightarrow 7q < 34 \Rightarrow q < \frac{34}{7} \Rightarrow q_{\max} = 4$$

$$a = 41 \times 4 = 164$$

۲- گزینه ۳ پاسخ است.

مطابق الگوریتم تقسیم داریم: $a = 23k + 9$ عددی فرد و در نتیجه k فرد است، پس می‌توان k را به صورت $(q \in \mathbb{Z}) 2q + 1$ نوشت. داریم:

$$a = 23(2q + 1) + 9 = 64q + 22 \Rightarrow \frac{a}{2} = 23q + 16$$

۳- گزینه ۳ پاسخ است.

$$a = 18k, b = 12q$$

$$a = bq' + r \Rightarrow 18k = 12qq' + r \Rightarrow r = 18k - 12qq' = 6(3k - 2qq') \Rightarrow r = 6m \Rightarrow 6 | r$$

۴- گزینه ۲ پاسخ است.

$$8 \cdot 2 = 14b + r \xrightarrow{\cdot \leq r < b} \begin{cases} r = 8 \cdot 2 - 14b \geq 0 \Rightarrow b \leq 5 \\ r = 8 \cdot 2 - 14b < b \Rightarrow b \geq 5 \end{cases} \Rightarrow 5 \leq b \leq 5$$

۵- گزینه ۱ پاسخ است.

$$\overline{abb} + \overline{baa} = 2k \Rightarrow a + b = 2k'$$

بنابراین a و b یا هر دو زوجند یا هر دو فرد.

$$b, a : \begin{cases} a = 2t \\ b = 2t' \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a^2 = 4t^2 \\ b^2 = 4t'^2 \end{cases} \Rightarrow a^2 - b^2 = 4q$$

$$b, a : \begin{cases} a = 2t + 1 \\ b = 2t' + 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a^2 = 4t^2 + 4t + 1 \\ b^2 = 4t'^2 + 4t' + 1 \end{cases} \Rightarrow a^2 - b^2 = 4q''$$

پس باقی‌ماندهی $a^2 - b^2$ بر ۴ صفر است.

۶- گزینه ۴ پاسخ است.

با توجه به این که اگر $a + b | a^n + b^n$ فرد باشد و بالعکس، پس:

$$82 | 3^n + 1 \Rightarrow 3^4 + 1 | 3^n + 1$$

پس باید $3^n + 1$ به صورت $1 + 3^{k+1}$ باشد، لذا n به صورت مضرب فرد ۴ درمی‌آید:

$$n = 4(2k + 1)$$

حال مضارب فرد دورقیمی چهار عبارتند از: $\{3 \times 4, 5 \times 4, \dots, 23 \times 4\}$ که یازده مقدار است. همچنین می‌توان به صورت زیر عمل کرد: یازده مقدار: $1 \leq 11 < 25 \Rightarrow 1 \leq k < 12 \Rightarrow k = 1, 2, \dots, 11 \Rightarrow 3 \leq 2k + 1 < 25 \Rightarrow 1 \leq n \leq 11$

نکته: در حالت کلی داریم:

$$a - b | a^n - b^n \quad a + b | a^{n+1} + b^{n+1} \quad a + b | a^{2n} - b^{2n}$$

و بر عکس اگر $a + b | a^n + b^n$ فرد باشد. می‌توانیم مثل روش حسابان بنویسیم: لذا اگر بخواهد

$a + b | a^n + b^n$ باشد، باید باقی‌ماندهی تقسیم $a + b$ بر $a^n + b^n$ برابر صفر باشد. پس باید:

$$a^n + (-a)^n = 0 \Rightarrow a^n = 0$$

$$\begin{cases} x | a - 2 \Rightarrow a - 2 = xk \\ x | b - 5 \Rightarrow b - 5 = xk' \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = xk + 2 \\ b = xk' + 5 \end{cases} \Rightarrow ab = xk'' + 1 \Rightarrow ab - 9 = xk'' + 1$$

راه حل دیگر: در حالت کلی داریم:

$$\begin{cases} x | a - b \Rightarrow x | ac - bc \\ x | c - d \Rightarrow x | bc - bd \end{cases} \Rightarrow x | ac - bd$$

لذا:

$$\begin{cases} x | a - 2 \\ x | b - 5 \end{cases} \Rightarrow x | ab - 10 \Rightarrow ab - 10 = xq \Rightarrow ab - 9 = xq + 1$$

۸- گزینه ۲ پاسخ است.

نکته: عدد $a^n + b^n$ به ازای مقادیر فرد n بر b بخش پذیر است، زیرا به ازای مقادیر فرد داریم:

$$a^n + b^n = (a+b)(a^{n-1} - a^{n-2}b + \dots + b^{n-1})$$

بنابراین:

$$2^{18} + 2^{18} = (2^2)^9 + (2^2)^9 = 9^9 + 4^9, \quad 9 + 4 | 9^9 + 4^9$$

نکته: در حالت کلی داریم:

$$\begin{aligned} n \in \mathbb{N} : \quad & a - b | a^n - b^n \\ & a + b | a^{n+1} + b^{n+1} \\ & a + b | a^n - b^n \end{aligned}$$

۹- گزینه ۱ پاسخ است.

روش اول: معادل دو عدد را در مبنای ۱۰ نوشت و از هم کم می‌کنیم.

$$(1100101)_2 - (110)_2 = (2^6 + 2^5 + 2^2 + 2^0) - (2^2 + 2^1) = 2^6 + \underbrace{2^5 - 1}_{2^1} = (1011111)_2$$

روش دوم: مشابه روشی که برای عمل تفاضل دو عدد در مبنای ده استفاده می‌کنیم انجام می‌دهیم. با این تفاوت که ارزش مکانی هر رقم دو برابر رقم سمت راست خودش است بنابراین در صورت لزوم از یک رقم، یک واحد کم کرده و به ازای آن ۲ واحد به رقم سمت راستش اضافه می‌کنیم. (در مبنای ۱۰ با انجام این کار ۱۰ واحد اضافه می‌کنیم.)

$$\begin{array}{r} (1100101)_2 \\ - (110)_2 \\ \hline (1011111)_2 \end{array}$$

۱۰- گزینه ۲ پاسخ است.

بزرگ‌ترین عدد چهار رقمی در مبنای ۵ برابر است با: $(4444)_5 = 5^4 - 1 = 624$

باقي‌مانده‌ی تقسیم این عدد بر ۹ برابر ۳ است، پس عدد $(4441)_5$ بر ۹ بخش پذیر است و داریم:

$$4 + 4 + 4 + 1 = 13 = \text{مجموع ارقام}$$

۱۱- گزینه ۲ پاسخ است.

می‌دانیم مربع هر عدد فرد به صورت $8k+1$ است پس $b=1$

$$(5 \cdot 0 \cdot 1)_8 \leq (5 \cdot a \cdot 1)_8 \leq (5 \cdot 7 \cdot 1)_8$$

$$2561 \leq (5 \cdot a \cdot 1)_8 \leq 2617 \Rightarrow 2561 \leq (51)^3 = 2601 \leq 2617$$

$$\begin{array}{r} 2601 \\ \hline 1 \quad | \quad 8 \\ \hline 325 \quad | \quad 8 \\ 5 \quad | \quad 40 \quad | \quad 8 \\ \hline \circ \quad | \quad 5 \quad | \quad 8 \\ \hline \quad | \quad 5 \quad | \quad 8 \\ \Rightarrow a+b=6 \end{array}$$

۱۲- گزینه ۱ پاسخ است.

بزرگ‌ترین عدد ممکن در مبنای ۷ عبارت است از:

$$(666)_7 = 6 + 6 \times 7 + 6 \times 7^2 = 342$$

که دقیقاً عدد قبل 7^3 است. اولین مکعب کامل قبل از 7^3 ، 6^3 است که زوج است، پس بزرگ‌ترین مکعب کامل فرد قبل از 7^3 عدد 5^3 است.

$$5^3 = 125 \quad | \quad 5 \\ \hline 119 \quad | \quad 17 \quad | \quad 5 \\ \hline 6 \quad | \quad 14 \quad | \quad 5 \\ \hline \textcircled{3} \quad | \quad \textcircled{1} \quad | \quad \textcircled{5} \\ \Rightarrow 5^3 = (236)_7$$

لذا بزرگ‌ترین مکعب کامل فرد در مبنای ۷، $(236)_7$ است.

$$a+b+c=11$$

دقت کنید در این گونه سؤالات منظور از مکعب کامل، مکعب کامل در مبنای ۱۰ است.

۱۳- گزینه ۲ پاسخ است.

ابتدا هر دو عدد را در مبنایهای داده شده بسط می‌دهیم:

$$(abc)_7 = (cba)_5 \Rightarrow 4a + 7b + c = 25c + 5b + a \Rightarrow 2b = 24c - 4a \Rightarrow b = 12c - 2a$$

$$\Rightarrow b = 12(c - 2a) \xrightarrow[12|b, + \leq b < 5]{\text{برق ااست در مبنای } 5} b = 0 \Rightarrow c - 2a = 0 \Rightarrow c = 2a$$

پس $a=1$ و $a=2$ (با توجه به این که $a < 5$ ، بنابراین فقط دو جواب دارد).

۱۴- گزینه ۱ پاسخ است.

$$2p+1=n^2 \Rightarrow (n^2-1)=(n-1)(n+1)=2p$$

$$\begin{array}{r} 1 \quad 2p \Rightarrow p=1 \\ 3 \quad p \Rightarrow \boxed{p=5} \\ p \quad 3 \Rightarrow p=1 \\ 2p \quad 1 \quad x \end{array}$$

۱۵- گزینه ۳ پاسخ است.

$$A = (3 \times 5 \times 7 \times 11 \times 13 \times 17 \times 19 + 3^2 \times 5^2) = 3 \times 5 \underbrace{(7 \times 11 \times 13 \times 17 \times 19 + 3 \times 5)}$$

این عدد بر اعداد ۷ و ۱۱ و ۱۳ و ۱۷ و ۱۹ و ۳ تقسیم پذیر نمی‌باشد اما چون جمع دو عدد زوج است، بر ۲ بخش‌پذیر است.

$$\Rightarrow 2|A \quad 3|A \quad 5|A$$

۱۶- گزینه ۳ پاسخ است.

چون $\sqrt{999} = 31$ است، لذا کافی است تقسیم پذیری بر بقیه اعداد اول بین ۲۲ و ۳۱ را کنترل کنیم. لذا حداکثر لازم است بر ۲۹ و ۳۱ تقسیم کنیم.

۱۷- گزینه ۳ پاسخ است.

$$\left. \begin{array}{l} p | 40! + p^r + p \\ p | p^r + p \end{array} \right\} \Rightarrow p | 40! \Rightarrow p = 2^{21} \pm 23 \pm 29 \pm 31 \pm 35 \pm 37 \pm 41 \pm 47 \pm 53 \pm 59 \pm 61 \pm 67 \pm 71 \pm 73 \pm 79 \pm 83 \pm 89 \pm 97$$

۱۸- گزینه ۲ پاسخ است.

چون مجموع دو عدد اول فرد است، حتماً یکی از دو عدد ۲ بوده است. لذا:

$$2+1+1=1+3 \Rightarrow 2 \times 1+1=2+2$$

۱۹- گزینه ۱ پاسخ است.

$$(160)_7 = 1 \times 7^2 + 6 \times 7^1 + 0 = 91 \Rightarrow (164)_7 = 95 , (165)_7 = 96 , (166)_7 = 97$$

۹۶ بر ۲ و ۹۵ بر ۵ و ۹۱ بر ۷ تقسیمپذیر است لذا ۹۱ از همه دیرتر حذف می شود. ۹۷ اول است و اصلًا حذف نمی شود.

۲۰- گزینه ۱ پاسخ است.

هر عدد اول بزرگتر از ۳ به صورت $6k \pm 1$ نوشته می شود و داریم:

$$p = 6k \pm 1 \Rightarrow p^r = 26k^r \pm 12k + 1 = 12 \underbrace{(3k^r \pm k)}_{k'} + 1 = 12k' + 1 \xrightarrow{k'=2q} p^r = 24q + 1$$

$$p^r + 47 = 24q + 48 = 24(q+2) = 24q' \Rightarrow 24 | p^r + 47$$

تذکر: حاصل عبارت $3k^r \pm k$ ، به ازای جمیع مقادیر صحیح k ، عددی زوج است.